2.e observation

Le Sujet de cette Seconde observation est une playe de tete avec commotion. on apporta, dit Monsieur Faivre, dans l'hopital un blessé agé d'environ vingt cinq ans que l'on lui ~~me~~ dit etre tombé il y avoit deux jours de sa hauteur sur une pierre sur laquelle le derriere de sa tete avoit portée. j'examinai aussitot la partie et j'observai vers le milieu de l'occipital du coté gauche une petite playe dans laquelle je reconnu par l'introduction d'un Stilet une fracture que je mis a decouvert par des incisions faites sur la partie. la portion inferieure de l'occipital etoit enfoncée. apres avoir tanté inutilement de la relever avec l'elevatoire, Monsieur Faivre appliqua sur la portion qui debordoit une couronne de trepan, puis une seconde a coté, et enfin une troisieme. mais il ne sortit par ces ouvertures que du sang caillé, et les accidents subsistant toujours, l'autheur fit des incisions par en bas au moyen desquelles il decouvrit que la fracture s'etendoit du coté opposé, ce qui le fit resoudre a appliquer deux autres couronnes de trepan l'une a droite et l'autre a gauche sur la cavité occipitale du cervelet, ce qui donna issue a du sang extravasé de tres mauvaise odeur. depuis cette evacuation presque tous les accidents cesserent, la connoissance revint au malade, et il prit un bouillon ce qu'il n'avoit encore pu faire jusqu'alors. a l'égard de la piece fracturée qui etoit enfoncée, Monsieur Faivre vint a bout de la relever par des efforts menagez au moyen ~~de~~ d'un elevatoire.

Malgré ces heureux Succez, vers le neufvieme jour apres l'operation il vit Suinter du pus du coté de l'apophyse mastoïde,

ARC 45 n° 111

et ayant comprimé legerement la dure mere vers cet endroit avec le meningophilax le malade eprouva dans le bras droit des mouvemens convulsifs mais momentanez. Monsieur faivre conduisit alors une incision jusqu'a l'apposite mastoide ~~a l'endroit~~ ou finissoit la fracture, et ~~appliqua~~ fit dans cet endroit une contre-ouverture par l'application d'une sixieme couronne de trepan alors tous les accidens disparurent peu a peu, l'exfoliation se fit au tems ordinaire, la playe se cicatrisa, et le malade jouit presentement d'une parfaite santé.

Quoique cette observation, a ne la considerer que du coté du nombre des couronnes de trepan qu'on a appliquées, n'ait rien qui doive nous surprendre, puisque nous savons qu'on en a quelquefois appliqué beaucoup plus sur un meme sujet, cependant comme en elle meme elle est tres importante, parcequ'elle nous presente une maladie tres rare et fort compliquée je pense que l'academie peut en faire usage, et l'inserer par extrait dans ses memoires.

A l'egard du coup d'epée porté a un particulier audessus du nombril par ou sortoit une grande portion d'epiploon, M.r faivre dit que le malade etant mort au bout de trois jours, il en fit l'ouverture, et trouva le grand lobe du foye percé, et dans la capacité du bas ventre un epanchement de sang grumelé. je ne vois rien d'extraordinaire dans cette observation; ainsi je pense que l'academie n'en doit faire aucun mention dans ses memoires.

Pour ce qui est des trois observations dont Monsieur faivre n'anonce que le titre dans son memoire, elles me paroissent assez interessantes pour meriter d'etre expliquées plus au long: ainsi je serois d'avis que l'academie ecrivit sur cela a l'autheur pour l'engager a les lui communiquer avec un detail plus circonstancié.

Sue l.r